



PROEXC
PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO E CULTURA

PROJETO DE EXTENSÃO
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

Implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Limoeiro, Pernambuco

2022-07 - EDITAL PIBEXC DE APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO

COORDENADOR(A): Vanessa Sá Leal - Docente

E-MAIL: vanessasaleal@yahoo.com.br

UNIDADE GERAL: CAV

UNIDADE DE ORIGEM: NUTRIÇÃO

INÍCIO DO PROJETO: 1/7/2022 **FIM DO PROJETO:** 31/12/2024

CARGA HORÁRIA:

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Unidades de Saúde da Família do Município de Limoeiro - PE.

OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O objetivo da proposta é implementar a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), do Ministério da Saúde (MS), na rede de atenção básica do município de Limoeiro. Trata-se de um estudo de intervenção translacional, estruturado através da realização de oficinas de educação em saúde, com Equipes de Saúde da Família, sobre aleitamento materno e alimentação complementar, utilizando-se uma metodologia crítico-reflexiva, com vistas à melhoria dos indicadores de alimentação infantil no município. As oficinas contarão com a atuação dos estudantes de nutrição e enfermagem participantes do projeto, junto às Equipes de Saúde, na promoção de discussões, na partilha de conhecimentos e no planejamento de ações. Para a organização e a execução das oficinas, bem como para a participação na coleta de dados, os estudantes passarão por treinamento prévio de 20 horas. Antes e após a intervenção, serão avaliados os conhecimentos dos profissionais de saúde acerca da promoção da alimentação infantil saudável, por meio de formulário validado para auto-aplicação, e serão analisados indicadores de aleitamento materno e de alimentação complementar de crianças menores de 2 anos, por meio dos marcadores de consumo do SISVAN, aplicados pelos estudantes às mães das crianças acompanhadas pelas Equipes de Saúde. Para as análises dos indicadores serão calculadas as razões de prevalência e respectivos intervalos de confiança de 95%, considerando-se significância estatística de 5% para as diferenças encontradas antes e após a intervenção.